

Un regard clair sur la chirurgie des paupières



BRUSSELS
EYE DOCTORS



La chirurgie des paupières



Un regard clair sur la chirurgie des paupières

L'âge avançant, l'ensemble du corps évolue et ceci se marque notamment au niveau du visage. L'évolution des paupières donne progressivement un air triste, fatigué et morose. L'apparence que l'on a en se regardant dans le miroir ne correspond plus à qui l'on est.

La chirurgie des paupières permet de remédier à cette évolution.
Pourquoi s'en priver ?

Le but de ce dépliant est de vous apporter une information globale sur les possibilités qui existent pour améliorer cette situation.

Mais avant toute chose, le but de l'ensemble des traitements disponibles est d'obtenir un résultat naturel et durable.



B R U S S E L S
E Y E D O C T O R S



Le traitement non chirurgical des rides

Deux possibilités sont envisageables pour corriger, atténuer, voire faire disparaître ces marques de l'âge.

La toxine botulique (Botox®, Bocouture®, Azzalure®) réduit l'action des muscles du visage responsables de l'apparition ou de l'accentuation de plis lors de la mimique (action dynamique) sans pour autant paralyser complètement les muscles eux-mêmes. Ceci permet d'obtenir un résultat de qualité et naturel. Ces injections ont un effet curatif (sur des plis existants, visibles et plus profonds) mais aussi un effet en partie préventif. Le résultat s'installe progressivement en 8 à 10 jours et dure 3 à 4 mois. Les injections permettent de corriger les « rides du lion », les rides du front, et celles de la patte d'oie.



L'acide hyaluronique (Teosyal®, Juvederm®) est un produit de comblement (« filler ») permettant de corriger les plis apparents en dehors de la mimique (action statique). Le résultat s'installe en 8 à 10 jours et dure 18 à 24 mois. Les indications sont principalement le comblement des sillons naso-géniens, des « rides du lion », et des cernes.

Ces deux produits sont complètement différents quant à leur mode d'action et peuvent dès lors être utilisés de manière complémentaire.

Chirurgie des paupières supérieures (blépharoplastie supérieure)

AVANT



APRÈS



Le relâchement de la peau et du muscle de la paupière provoquent un air triste et fatigué, parfaitement corrigé par cette chirurgie simple, avec des résultats très immédiats et de longue durée.

Lifting frontal

AVANT



APRÈS



Parfois le relâchement du front provoque un affaissement des sourcils, eux-mêmes responsables d'un abaissement des paupières supérieures, ce qui accentue ou provoque un (pseudo) excès de peau et l'apparence des paupières.

Dans ce cas, le lifting frontal, associé ou non à une blépharoplastie, corrige de manière spectaculaire le visage.



Chirurgie des paupières inférieures (blépharoplastie inférieure)



L'évolution avec le temps des paupières inférieures est similaire à celle des paupières supérieures avec en plus, cette fois, l'apparition de cernes et parfois d'un ectropion (décollement de la paupière rendant visible son versant interne, rouge, inesthétique).



Les blépharoplasties supérieure et inférieure sont réalisées sous anesthésie locale.

Autres interventions des paupières

D'autres situations cliniques peuvent se présenter et faire l'objet d'une correction chirurgicale, pour la plupart simple et sous anesthésie locale.

Ectropion (décollement inesthétique de la paupière rendant visible son versant interne, rouge).

Entropion (bascule de la paupière vers l'œil avec irritation de l'œil par les cils).



Ptosis de la paupière supérieure : asymétrie importante des paupières secondaire à un relâchement ou une désinsertion du muscle releveur, associée à une diminution plus ou moins importante du champ visuel.



Renseignements généraux

Avant :

La majorité des interventions chirurgicales des paupières se fait sous anesthésie locale et sont, en général, étonnement, peu douloureuses. (seule l'anesthésie locale est désagréable).

Vous ne devez pas être à jeun.

Si vous êtes de nature anxieuse, vous pouvez prendre un calmant la veille et/ou le matin de l'intervention.

Un traitement en cours doit toujours être signalé, en particulier, la prise d'anti-coagulants (Aspirine®, Sintrom®, Plavix®, ...) ainsi que d'éventuels antécédents ophtalmologiques.

Après :

Après l'intervention, vous pouvez quitter immédiatement le cabinet. Un pansement n'est, en général, pas nécessaire.

8

Dans tous les cas, il vaut mieux être accompagné(e) pour le retour à la maison.

Il est conseillé de rester au repos le jour et le lendemain de l'intervention. Par la suite, vous pourrez reprendre progressivement vos activités.

Les gonflements et ecchymoses (bleus) sont les suites opératoires les plus fréquents.

Les ecchymoses, lorsqu'elles surviennent, sont visibles une à deux semaines. Le gonflement est habituellement peu important. L'un et l'autre font l'objet d'un traitement préventif. Il s'agit de suites opératoires normales.

Lorsque l'anesthésie locale cessera son effet, vous ressentirez une sensation désagréable qui disparaît rapidement et qui est peu douloureuse.

Où se déroule l'opération ?

Brussels Eye Doctors, à proximité du square Montgomery :
Boulevard Saint Michel, 12-16 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre.
Les rendez-vous peuvent être fixés via :
Tél: **+32-2-741.69.99** / mail: **info@vryghem.be**

Brussels eye doctors a été créé par le docteur Jérôme c. Vryghem et dispose d'une infrastructure très moderne avec, entre autre, deux salles d'opération complètement équipées: une salle réservée à la chirurgie intra-oculaire et une salle laser.

ISO 9001: 2008 certified

Brussels eye doctors se veut un cabinet d'ophtalmologie moderne et professionnel qui se distingue des autres pratiques par la qualité des services assurés et de la médecine pratiquée. Au centre de nos préoccupations sont la satisfaction du patient et une évaluation continue de nos services. Brussels eye doctors a obtenu, en juillet 2006, après une réorganisation approfondie et plusieurs audits effectués par Lloyd's register Quality Assurance, la certification ISO 9001: 2000/2008.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur **www.brusselseyedoctors.be**
of **www.vryghem.be**




Qui effectue ces opérations ?

Le Professeur Pierre VICO qui a obtenu sa reconnaissance en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique en 1993. Il s'est spécialisé en Belgique chez le Professeur Madeleine Lejour et à Montréal, Canada, chez le Professeur Roger Paul Delorme.



Il est actuellement Professeur de chirurgie plastique à la faculté de médecine de l'Université Libre de Bruxelles et chef de service de chirurgie plastique et esthétique à la Clinique Saint Jean à Bruxelles.





BRUSSELS
EYE DOCTORS

www.brusselseyedoctors.be | www.vryghem.be